

Conseils pour éviter la propagation de la rhinopneumonie équine (EHV1 & EHV4) - avril 2023

Lignes directrices

- Les écuries où des chevaux présentent des symptômes et/ou un contact direct avec une écurie ou un cheval infecté doivent consulter un vétérinaire afin d'établir un diagnostic correct et mettre idéalement en place une quarantaine au sein de leurs infrastructures.
- La rhinopneumonie ne se propage pas dans l'air libre tout seul, il n'y a donc pas de danger s'il n'y a pas de contact direct rapproché avec des chevaux infectés. Il faut néanmoins garder quelques mètres de distance et éviter le partage de matériel ou tout contact d'un animal à un autre.



Rassemblement de chevaux

- Les concours et transports peuvent se dérouler normalement s'il n'y a pas de chevaux malades. Si un organisateur le souhaite, il peut évidemment annuler sa manifestation de sa propre initiative.
- La vaccination est notre seul et meilleur outil pour contrôler et éviter les épidémies à l'avenir. Une bonne politique de vaccination peut réduire de manière significative la circulation des virus dans notre population équine. Vacciner est et reste dès lors un acte responsable et utile, même s'il n'y a pas d'apparitions de cas à ce moment-là.

Cours, stages, entraîneur externe

- Stages et cours extérieurs autorisés
- Entraîneur extérieur : autorisé suivant les règles internes à chaque écurie mais en évitant les contacts avec les chevaux.
- Maintenir les principes de sécurité avec les maréchaux-ferrants et ostéopathes.




Rester alerte aux symptômes

- Fièvre, gonflement des membres.
- Maladie respiratoire : écoulement nasal, toux
- Signes neurologiques et paralysie : manque de coordination, difficulté de marcher, faiblesse, incontinence ou difficulté d'uriner/déféquer, paralysie de la queue, impossibilité de se tenir debout.



Eviter la transmission

- Ne pas caresser tous les chevaux de l'écurie et ne toucher que celui dont le cavalier s'occupe.
- Ne pas prêter le matériel entre les chevaux et cavaliers.
- Se laver/désinfecter les mains et laver ses vêtements régulièrement.



Mon cheval a des symptômes : que faire?

- Appelez votre vétérinaire.
- Placez votre cheval en quarantaine pendant au moins 3 à 4 semaines après la fin des symptômes.
- Prendre la température rectale du cheval deux fois par jour.
- Les chevaux ayant été en contact avec le cheval infecté doivent être identifiés, isolés et testés.
- Changer de vêtement et prendre une douche avant d'aller soigner un autre cheval.



! Pour rappel, le virus ne contamine que les équidés. Par contre, il est transmissible par l'homme ! Si votre écurie est touchée, il est impératif de prévenir les propriétaires, votre maréchal-ferrant et toute personne pouvant venir à l'écurie.

La LEWB n'impose aucune règle et n'a aucun pouvoir de contrôle (le EHV n'étant pas reconnu comme maladie officielle par l'AFSCA). Nous sensibilisons et proposons des conseils sur avis vétérinaires.